

## 防除日の変更について（号外第2号）

開花の早回りにより、防除日を再度、早めます！！

令和2年3月31日  
富山農林振興センター  
なのはな農業協同組合

梨の生育は、今冬からの高温により、平年に比べかなり早く進んでいます。このことから、今後の防除日を下記のとおり再度、変更しますので、注意願います。

### 【防除スケジュール（吉作：「幸水」基準）】

散布月日		薬剤名と濃度		散布量	主な対象病害虫	防除実施日 (自己記入)
4	変更 <b>4月5~7日</b> (開花直前) <b>1分咲き</b>	スコア顆粒水和剤 ベルコートフロアブル	4,000倍 1,500倍	300 ℓ	<b>黒星病</b> 、赤星病、 輪紋病、黒斑病 うどんこ病	
5	変更 <b>4月14~16日</b> (落花直後)	トレノックスフロアブル	500倍	300 ℓ	<b>黒星病</b> 、赤星病、 心腐れ症(胴枯病菌)	
6	変更 <b>4月22~24日</b> (落花10日後)	オーシャイン水和剤 トレノックスフロアブル ハチハチフロアブル	4,000倍 500倍 2,000倍	300 ℓ	<b>黒星病</b> 、赤星病、 芯腐れ症 (胴枯病菌) <b>ニセナシサビダニ</b> 、アブ ラムシ類、クワコナカイ ガラムシ	

※3回目と4回目の防除は3日以上開けて散布してください。

※上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としていますが、本年は地域間の生育差が例年よりも小さいので、自園地の生育状況を十分確認して、防除が遅れないように注意してください。

※第4回目（開花直前）の防除は、治療効果が期待される重要な殺菌剤散布となりますので、晴れ間をみて確実に実施するようお願いいたします。

※新高、豊水等開花の早い品種については、可能であれば早めに散布してください。

※黒星病の芽基部病斑は見つけ次第、切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

※生育の早まりによる、霜の被害に注意してください（栽培情報2号参照）。