

## 1 梨の開花および生育について

梨の生育は、3月まで高温傾向であったことから、いずれの品種も昨年、平年に比べ早くなっております。「幸水」は近日の低温傾向により、開花時期が予想よりも遅くなりましたが、開花状況を見極めながら、確実な受粉に努めてください。

令和2年 呉羽地区日本なし開花状況

(吉作平場基準)

品種名	開花始め			満開		
	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比
幸水	4月15日	▲1	▲2			
豊水	4月8日	▲5	▲6	4月13日	▲3	▲5
あきづき	4月12日	▲3	▲3	4月15日	▲3	▲3
新高	4月4日	▲5	▲8	4月8日	▲4	▲7

▲は早いことを示す(例: ▲6は「6日早かった」)。

## 2 黒星病の発生状況について

### ① 落葉からの子のう胞子飛散

黒星病の感染源の一つである落葉からの子のう胞子は、落葉処理園地での飛散はほとんどありませんが、モニタリング調査(人為的に落葉をかきあつめ胞子を飛散しやすくしている調査)で、3月31日からの飛散量が昨年、一昨年と比べて多くなっています。

なお、胞子飛散は通常5月末まで続くため、今後とも適期防除(間隔の遵守、雨前散布など)に努めてください。

表1 落葉からの子のう胞子数の推移(モニタリング調査)

調査日	3月25日	3月31日	4月6日	4月10日	4月15日
R2	0.5	7.5	18.0	4.0	28.0
H31	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7
H30	1.2	0.0	0.2	0.2	5.0
H29	0.0	0.6	0.6	18.0	101.4
H28	0.0	2.2	2.8	20.4	70.2

※数値は胞子採取器(スライドガラス1.5cm四方)に付着した胞子数の平均値(産地内3カ所 H31までは2ヶ所)

※モニタリング調査では、胞子の動向を把握しやすくするため、人為的に落葉をかきあつめ胞子を飛散しやすくしている調査であり、この結果は落葉処理効果とは無関係です。

表2 落葉処理園地における子のう胞子数の推移

調査日	3月25日	3月31日	4月6日	4月10日	4月15日
R2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
H31	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
H30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
H29	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4
H28	0.0	0.5	3.8	2.3	1.3

※数値は胞子採取器(スライドガラス1.5cm四方)に付着した胞子数の平均値(落葉処理3園地)

### ② 気象データによる感染危険度・発病危険度(千葉梨防除ナビより)

本年も千葉県で開発されたシステムを利用して、園地の温度と湿度データから黒星病の感染危険度と発病危険度を数値化(0~9の10段階評価)し、情報発信を行っています。

4月1日~14日に感染危険度は発生せず、このことから潜伏期間を経た15日後(4月16日~29日)の発病危険日も発生しませんでした。(昨年のこの期間の感染危険度、発病危険度ともに0回)。

しかし、上記のとおりモニタリング調査で胞子飛散が多かったことから、今後の発病に注意してください。

**☆重要☆: 黒星病芽基部病斑や果実、葉への発病が見られた場合、速やかに除去し園地外で適切に処分してください。**

### 3 これからの防除について

☆防除は「降雨前」、SSは「低圧、低速、全列走行」を心掛けましょう

回数	散布月日	薬剤名と濃度	散布量	主な対象病害虫	防除実施日
5	4月20～23日 (落花直後)	トレノックスフロアブル 500倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、心腐れ症 (胴枯病菌)	
特	4月22～28日頃	コンフューザーN 150本/10a		リンゴコカモンハマキ、モシクイガ ナシバシクイ	
6	4月28～30日 (落花10日後)	オーシャイン水和剤(DMI) 4,000倍 トレノックスフロアブル 500倍 ハチハチフロアブル 2,000倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、心腐れ症 (胴枯病菌) ニセザンギダニ、アブラムシ類	
7	5月7～9日 (小豆大)	ユニックス顆粒水和剤 47 2,000倍 トレノックスフロアブル 500倍 サイアノックス水和剤 1,000倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、心腐れ症 (胴枯病菌)、黒斑病 アブラムシ類、シクイムシ類 ハマキムシ類	
8	5月16～18日	トップジンM水和剤 1,500倍 トレノックスフロアブル 500倍	300 ℓ	黒星病、赤星病、心腐れ症 (胴枯病菌)、輪紋病	
9	5月24～26日	ベルコートフロアブル 1,500倍 ファルコンフロアブル 6,000倍	300 ℓ	黒星病、輪紋病、うどんこ病 ハマキムシ類、ケムシ類	

- ① 散布に当たっては、濃度や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。
- ② 交配期間中にトレノックスフロアブルを散布すると実止まりが悪くなる可能性があるため、必ず落花後に散布してください。
- ③ 防除間隔は、10日以上空かないように注意してください。
- ④ ナシアブラムシの発生（葉を内側に巻いて加害する）が見られたら、早めにアドマイヤー水和剤（2,000倍）を散布してください。
- ⑤ カメムシ類の常発園、シクイムシ類多発園では、アクタラ顆粒水溶剤（2,000倍）を散布してください。

### 4 「幸水」の1回目摘果作業の留意点

満開30日後までに終了させることが、  
幼果の細胞分裂（果実肥大）に重要！

- 「幸水」の1回目の摘果作業は、大玉生産に不可欠な作業なので満開30日後までの作業終了を目指しましょう。
- 4月上旬に短時間ですが「あられ」が確認されていることから、被害果実に注意しながら作業を進めましょう。

### 5 コンフューザーNは確実に設置しましょう！


昨年、シクイムシ類の被害果実が発生した園地では、本年も発生密度が高まる恐れがありますので、確実に「コンフューザーN」の設置をお願いします。

#### 設置方法

- 1) 設置本数：150本/10a
- 2) 設置時期：4月22～28日頃
- 3) 設置間隔：約2.6m間隔（3間植えの園地では1樹当たり4～4.5本の割合で設置）

#### 設置上の留意事項

- 1) ほ場の外周は有効成分濃度が薄くなるため、**多めに設置**する（単独園や道路等に面している園では、外周の防風ネットを張り、有効成分の飛散を防止する）。
- 2) ほ場内に未成木樹や間拔等で樹の植わっていない場所があっても、これら場所を含めほ場全体に設置する
- 3) 傾斜地では**斜面上側を多めに**、下側は少なめに設置する。
- 4) **周辺にモモやウメがある場合には**、これらも含めて設置する。



梨棚の番線に巻きつけてから、一端を輪にくぐらせて固定してください（強く引っ張り固定すると端が切れる恐れがあるので、注意して下さい）。

### 6 予備枝の一本化と短果枝育成

予備枝の新梢が10～15cm程度伸びた頃に（5月上中旬）先端の1本を残して、他の新梢に摘心を実施し、予備枝の一本化と短果枝の育成を図りましょう。

