

「富富富」情報(第3号)

令和元年5月

J Aなのはな「富富富」ブランド化推進協議会

富富富は、田植え以降、天気に恵まれて順調に活着しています。
今後は水管理を中心に適切に管理を行い、早期に充実した茎を確保しましょう。

1 中干しまでの水管理

中干しまでは、水深2～3cm程度の**浅水管理**を行い、分げつの発生を促進しましょう。

※水は早朝に入れ、日中は止水で田水温の上昇に努めましょう。

※田がわいたり、藻が発生した場合は、水の入れ換えや軽い田干しを行いましょう。

2 溝掘り

中干しの効果を高めるために、必ず**溝掘り**を実施しましょう。

溝掘りの時期	田植え3週間後頃に軽い田干しをしてから、溝掘りを行う。
溝掘りの目安	10～15条に1本を目安に溝を掘る。溝はしっかり水尻に連結する。

3 中干し

無効分げつを抑え、地耐力の確保のため、遅れずに**中干し**を行いましょう。

中干しの時期	田植え1か月後 <u>までに</u> 中干しを開始する。
中干しの目安	普通乾田 → 長靴が沈まない程度(3～5日間)の田干し 水はけ悪い田や粘土質田 → 強め(5～7日間)の田干し

溝を掘り、しっかり干す！



4 雑草防除

雑草が残った場合は、必要に応じて除草剤を遅れずに散布しましょう。

※除草剤の効果を高めるため、散布前に軽い田干しを行い、水を入れ替えてから散布しましょう。

※除草剤散布の際には、使用基準を遵守し、周辺の作物に飛散しないよう注意しましょう。

表 随時除草剤の使用基準

対象雑草	薬剤名	使用時期	10a 当たり使用量	成分数
ノビエ	クリンチャー1キロ粒剤	田植後7日～ノビエ4葉期まで (収穫30日前まで)	1 kg	1
		田植後25日～ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5 kg	1
	クリンチャーEW	田植後20日～ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)	100ml (希釈水量100L)	1
広葉雑草	バサグラン粒剤	田植後15～50日まで (収穫60日前まで)	3～4 kg	1
	バサグラン液剤	田植後15～50日まで (収穫50日前まで)	500ml (希釈水量100L)	1
ノビエ 広葉雑草	ワイドアタックSC	田植後25日～ノビエ5葉期まで (稲6葉期以降、収穫30日前まで)	100ml (希釈水量100L)	1

※種子消毒から本田防除までの化学合成農薬の**成分使用回数**が**12以内**となるように留意しましょう。