防除日の変更について（号外１号）

令和３年３月２６日
富山農林振興センター
なのはな農業協同組合

１　防除日の変更について

梨の生育は、近日の高温により早まっており、桜の開花や３月 ２５日に気象台から発表された１か月予報等から予測した梨の開花は、平年に比べさらに早くなる見込みです。

このことから今後の防除日を下表のとおり変更しますので、注意願います。

【防除スケジュール（吉作：「幸水」基準）】

	散布月日		薬剤名と濃度		散布量	主な対象病害虫	防除実施日（自己記入）
2	変更	4月1日～3日頃（りんぽう脱落期）	ベルクートフロアブル ダイアジノン水和剤34	1，500倍 1，000倍	300リットル	**黒星病**、輪紋病 ﾊﾏｷﾑｼ類、ｼﾝｸｲﾑｼ類、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	
	※「幸水」長果枝のりんぽうが脱落したことを確認して防除を実施してください！！脱落前のりんぽうに農薬が付着しても、りんぽう脱落後に農薬付着が不十分な組織が現れ、感染リスクが高まります。						
3	変更	4月7～10日（開花直前）1分咲き	スコア顆粒水和剤 ベルクートフロアブル	4，000倍 1，500倍	300リットル	**黒星病**、赤星病 輪紋病、黒斑病、うどんこ病	
4	変更	4月17～19日（落花直後）	デランフロアブル	1，000倍	300リットル	**黒星病**、赤星病 心腐れ症（胴枯病菌）	
5	変更	4月25～27日（落花10日後）	オーシャイン水和剤 トレノックスフロアブル ハチハチフロアブル	4，000倍 500倍 2，000倍	300リットル	**黒星病**、赤星病 心腐れ症（胴枯病菌） **ﾆｾﾅｼｻﾋﾞﾀﾞﾆ** アブラムシ類 ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	

※上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としています。*自園地の生育状況を十分確認して、防除を実施してください。*

※今後の霜の被害に注意してください（対策は栽培情報２号参照）。

２　りんぽう脱落期（第2回目）防除の留意点について

- 「幸水」（長果枝）のりんぽう脱落を確認した後、防除を実施してください（*4月１日～３日は目安です）。*
- 雨前散布よりも、りんぽう脱落の状況を重視してください。
  ⇒りんぽう脱落が不十分なまま防除すると、脱落後に農薬の付着が不十分な組織が現れ、黒星病の感染リスクが高まります（下図参照）。

りんぽう脱落

農薬が付着していない組織が発生

りんぽう脱落直前
１回目デランフロアブル防除時期

りんぽう脱落期
２回目デランフロアブル防除時期