【緊急特報】
カメムシ注意

令　和　３　年　８　月
なのはな農業協同組合
富山農林振興センター

目指せ！ なのはな米１等比率９５％以上!!
～「Ｒ３　ＪＡなのはな米品質向上運動」実施中～

今年は、コシヒカリでもカメムシ類が多発！！

アカヒゲホソミドリカスミカメ

アカスジカスミカメ

トゲシラホシカメムシ

クモヘリカメムシ

発生量が多い
（確認地点率、発生頭数ともに高い状態）

表　斑点米カメムシ発生状況調査（8/2）

年次	発生地点率（%）	発生頭数（頭/箇所）
R3	70．6%	1．4頭
平年	36．8%	0．5頭

適期の２回防除を確実に行いましょう!!

→**穂揃期**（出穂3～5日後頃）と**傾穂期**の基本防除を徹底しましょう。

→**防除間隔は7日間**を目安（10 日以上あけない）としましょう。

→防除の際は、畦畔にも薬剤がかかるようにしましょう。

高温注意

今後、高温が続くと予想されています。
人も稲も高温対策が必須です！

【水稲】 出穂後20日間は湛水管理の徹底を！

（1）出穂後20日間の湛水管理

・稲体の活力を維持し白未熟粒の発生を抑えるため、**出穂後20日間は水深3cm程度の湛水状態**を保ちましょう。
・減水深に応じてこまめに入水し、田面が露出しないようにしましょう。
・水持ちのよいほ場では適宜、水の入れ替えを行い、根の老化を防ぎましょう。

（2）収穫5～7日前までは間断かん水

・湛水管理の後、刈取りの5～7日前までは間断かん水により根に水分と空気を十分に補給しましょう。



【皆さん】 熱中症を予防するため、適切な水分補給やこまめな休憩等をとりましょう！

① 天気予報と体調をチェックし、高温時の作業は極力避けましょう！
② 20分おきに、水分補給とこまめな休息をとりましょう！
③ 屋外の作業では、帽子や熱を逃しやすい服装を着用しましょう！
④ 屋内作業では必要に応じて送風機などを利用しましょう！
⑤ 作業は二人以上で行うか、定期的に声をかけるなど異常がないか確認しながら行いましょう！
⑥ 屋外で人と十分な距離（少なくとも2m以上）が確保できる場合は、適宜マスクをはずしましょう！