

# 防除内容の変更について（号外2号）（吉作・住吉版）

令和4年4月19日  
なのはな農業協同組合

吉作・住吉地区の一部園地で、ハマキムシ類による食害が多く発生しています。被害の多い園地では、5回目の防除にサムコルフロアブル10（年3回以内）を追加してください。

## 【防除スケジュール（吉作：「幸水」基準）】

回数	散布月日	薬剤名と希釈倍数		散布量	主な対象病害虫	防除実施日 (自己記入)
5	4月22～24日 (落花後)	デランフロアブル	1,000倍	300 リットル	黒星病、赤星病 心腐れ症(胴枯れ病菌) ハマキムシ類、 ケムシ類	
		<u>サムコルフロアブル10(追加)</u>	<u>5,000倍</u>			

4回目の防除でサムコルフロアブル10（年3回以内）を散布した園地では、  
ファルコンフロアブル（6,000倍、年2回以内）を混用してください。

※上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としています。自園地の生育状況を十分確認して、防除を実施してください。

※雨天が予想される場合は、雨前散布を心掛けてください。

※ハマキムシ類の発生が多い園地では、8回目の防除にカスケード乳剤（2,000倍）を混用してください。

※散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。

※黒星病の芽基部病斑は見つけ次第、切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

**周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください**