

防除内容の変更について（号外3号）

令和4年5月13日
なのはな農業協同組合
JAいみず野果樹部会

5月10日頃から産地全域で「幸水」・「豊水」を中心に、果実や果実の軸への黒星病斑の発生が、近年中では多い傾向にあることから、以下のとおり防除内容を変更します。

【防除内容（吉作：「幸水」基準）】

| 回数 | 散布月日 | 薬剤名と希釈倍数 | 散布量 | 主な対象病害虫 | 防除実施日 (自己記入) | |
|------|------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------------|--|
| 特別防除 | <u>5月17～19日</u> | <u>ベルコートフロアブル</u> | 1,500倍 | 300 リットル | 黒星病、輪紋病、うどんこ病 | |
| 8 | <u>5月24～26日</u> | デランフロアブル | 1,000倍 | 300 リットル | 黒星病、赤星病、輪紋病、心腐れ症（胴枯れ病菌） | |
| 9 | <u>5月31日</u> <u>～6月2日</u> | ベルコートフロアブル ファルコンフロアブル | 1,500倍 6,000倍 | 300 リットル | 黒星病、輪紋病、うどんこ病 ハマキムシ類、ケムシ類 | |

※今後、果実や果実の軸、葉の黒星病斑、芽基部病斑が感染源となり、被害が拡大する恐れがあります。これらは見つけ次第、早急に切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

※上記防除スケジュールは、7日間隔を基準としています。雨天等、天候に留意して防除を実施してください。

※開花期間中にハマキムシ類の発生が多かった園地では、特別防除または、8回目の防除にカスケード乳剤（2,000倍）を混用してください。

※散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。また、こまめに水分を補給するなど、熱中症の発生に留意してください。

周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください。特に、通学路に面した園地では、登下校時の時間帯を考慮して散布してください。