

梨のハダニ類の特別防除について（号外8号）

令和4年7月6日
なのはな農業協同組合
富山県富山農林振興センター

ダニゲッターフロアブル散布により、ハダニ類の多くは死滅しましたが、現在、生き残りが見られる梨園地があります。

このことから、ハダニ類による葉焼け症状が目立つ園地では、殺ダニ剤「ダニオーテフロアブル」(2,000倍 収穫前日まで) (※1, 2, 3) 400 ㍓/10a を散布してください。

- ※1 ダニオーテフロアブルは単剤で散布してください。
- ※2 散布は15回目の防除（7月11～13日）と16回目の防除（7月21～23日）の間に実施してください。ただし、薬害発生防止のため、散布間隔は3日以上空けてください。
- ※3 ダニオーテフロアブルは薬剤の用意に数日要する場合がありますため、日数に余裕をもって注文いただきますようお願いいたします。

- ・「幸水」収穫前の殺ダニ剤「マイトコーネフロアブル」の特別防除については7月下旬発行予定の栽培管理情報6号で案内します。
- ・散布前の草刈り実施により、殺ダニ剤の効果が高まります。
- ・散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。
- ・周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください。特に、通学路に面した園地では、登下校時の時間帯を考慮して散布してください。

こまめに水分を補給するなど、熱中症に留意してください。