



富富富の生育は順調に進んでいます。

今後は、高品質な富富富の生産に向け、適期に溝掘り、中干しを行いましょう

1 中干しまでの水管理 水深2~3cm程度の浅水管理を徹底

- ・ 水は早朝に入れ、日中は止水で田水温の上昇に努めましょう。
- ・ 田がわいたり、藻が発生した場合は、水の入れ換えや軽い田干しを行いましょう。




2 溝掘り 中干しの効果をもとめ、必ず溝掘りを実施

時期	田植後3週間頃に軽い田干しをして、溝掘りを行う。
目安	10~15条に1本を目安に溝を掘る。 溝はしっかり水尻に連結する。

3 中干し 無効分けつを抑え、地耐力確保に向け遅れず中干し

時期	田植後4週間までに中干しを開始する。
目安	普通田 → 長靴が沈まない程度(3~5日間)の田干し 水はけ悪い田や粘土質田 → 強め(5~7日間)の田干し

【溝掘り・中干し実施イメージ】



- 【中干しの効果】
- ・ 無効分けつの抑制
 - ・ 土中への酸素供給
 - ・ 地耐力の向上

4 雑草防除 雑草が残った場合は、必要に応じて除草剤を散布

- ・ 除草剤を使用する際は、登録内容を遵守し、周辺に飛散しないよう注意しましょう。
- ・ 種子消毒から本田防除までの化学農薬の成分使用回数が12以内となるよう留意しましょう。

【除草剤の使用基準】

対象雑草	薬剤名	使用時期	10a 当たり使用量	成分数
ノビエのみ	クリンチャー 1キロ粒剤	田植後7日~ノビエ4葉期まで (収穫30日前まで)	1kg	1
		田植後25日~ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5kg	1
	クリンチャーEW	田植後20日~ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)	100ml (希釈水量 25~100ℓ)	1
広葉雑草のみ	バサグラン粒剤	田植後15~55日まで (収穫60日前まで)	3~4kg	1
	バサグラン液剤	田植後15日~55日まで (収穫50日前まで)	500ml (希釈水量 70~100ℓ)	1
ノビエと 広葉雑草	ワイドアタックSC	田植後25日~ノビエ5葉期まで (稲6葉期以降、収穫30日前まで)	100ml (希釈水量 100ℓ)	1