

防除日の変更について(号外2号)(追分・吉作・住吉・花木版)

令和5年4月7日
呉羽地区果樹組合連合会
なのはな農業協同組合

1 防除日の変更について

当初の予測よりも梨の開花が早まっているため、今後の防除日を下表のとおり変更します。

【防除スケジュール(吉作:「幸水」基準)】

		散布月日	薬剤名と濃度		散布量	主な対象病害虫	防除実施日 (自己記入)
5	変更	4月13~15日 (落花直後)	デランフロアブル	1,000倍	300 ㍓	黒星病、赤星病 心腐れ症(胴枯 病菌)	
6	変更	4月22~24日 (落花10日後)	オーシャイン水和剤 トレノックスフロアブル ハチハチフロアブル	4,000倍 500倍 2,000倍	300 ㍓	黒星病、赤星病 心腐れ症(胴枯 病菌) ニセザビダニ アブラムシ類 クワカカガラムシ	

※上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としています。自園地の生育状況を十分確認して、防除を実施してください。

※開花期頃にハマキムシ類の発生が多かった園では5回目のデランフロアブルにサムコルフロアブル10(5,000倍)を混用してください。

※散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。

※周囲の他作物や住宅等への飛散防止に努めてください。特に通学路に面した園地では登下校時の時間帯を考慮して散布してください。

※黒星病の芽基部病斑は見つけ次第、切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

※今後の霜の被害に注意してください(対策は栽培情報2号参照)。

周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください