

# 【訂正版】黒星病の防除対策について（号外3号）

令和5年5月11日  
 なのはな農業協同組合  
 JAいみず野果樹部会

園地によって差はありますが、産地全域で果実や果実の軸、葉柄、新梢に、黒星病斑が多発しています。このことから、9回目と10回目の防除を以下のとおり変更してください。

なお、9回目のアプロードフロアブルは、カイガラムシ類の発生予察に合わせて散布時期を遅らせますので、9回目には混用しないようご注意ください。

## 【防除内容】

### ◆旧・第1選果場管内の園地

回	散布月日	薬剤名と希釈倍数	散布量	主な対象病害虫	防除実施日
◎変更内容：防除日の変更、殺菌剤の追加、殺虫剤の削除（11回目へ移動）					
9	<u>5月17</u> <u>～19日</u>	<u>ミギワ20フロアブル</u> ベルコートフロアブル	<u>2,000倍</u> 1,500倍	300 リットル	黒星病、輪紋病、うどんこ病
◎変更内容：防除日の変更					
10	<u>5月26</u> <u>～28日</u>	オキシラン水和剤 ファルコンフロアブル トランスフォームフロアブル	600倍 6,000倍 2,000倍	300 リットル	黒星病、輪紋病、うどんこ病 ハマキムシ類、ケムシ類、カイガラムシ類、アブラムシ類

### ◆旧・第2選果場管内の園地

回	散布月日	薬剤名と希釈倍数	散布量	主な対象病害虫	防除実施日
◎変更なし					
8	5月13 ～15日	デランフロアブル	1,000倍	300 リットル	黒星病、赤星病、輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌)
◎変更内容：防除日の変更、殺菌剤の追加、殺虫剤の削除（11回目へ移動）					
9	<u>5月20</u> <u>～22日</u>	<u>ミギワ20フロアブル</u> ベルコートフロアブル	<u>2,000倍</u> 1,500倍	300 リットル	黒星病、輪紋病、うどんこ病
◎変更内容：防除日の変更					
10	<u>5月28</u> <u>～30日</u>	オキシラン水和剤 ファルコンフロアブル トランスフォームフロアブル	600倍 6,000倍 2,000倍	300 リットル	黒星病、輪紋病、うどんこ病 ハマキムシ類、ケムシ類、カイガラムシ類、アブラムシ類

※11回目以降の防除は、栽培管理情報4号（5/18頃発行予定）で案内します。

※現在発病している果実や葉、新梢、芽基部病斑は、見つけ次第、早急に切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

※雨天が予想される場合は、降雨前散布を心がけてください。

※散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫等、農薬容器のラベルを必ず確認してください。

※周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください。

特に、通学路に面した園地では、登下校時の時間帯を考慮して散布してください。また、防除開始時間は、午前5時以降としてください。