

「英数確保のための畦間かん水」「適正な病害虫防除」「早めの雑草対策」
を徹底し、品質・収量の高い大豆づくりを目指しましょう！！

1. 畦間かん水

～開花期以降のかん水で、
落花・落莢、青立回避～

- ・培土作業でできた溝と額縁排水溝は必ず連結して排水口につなぎ、スムーズに入水、排水ができるようにしましょう。
- ・開花期頃(全株数の40～50%が開花)から、9月上旬頃までの間に3日以上晴天日が続くと見込まれる場合は、積極的に畦間かん水を行い、落花・落莢を回避し、英数の確保に努めましょう。
- ・畦間かん水は短時間で実施し、ほ場全体に水が行き渡ったら水口を止め、速やかに排水しましょう。

排水口まで
溝を連結

畦間と額縁排水溝を連結し、
入排水を促進

葉が裏返った状態の大豆
(かん水が必要！)

2. 雑草防除

- ・培土後も残草が見られる場合は、雑草の種類や生育状況を確認し除草剤を散布しましょう。

○難防除雑草（帰化アサガオ類、イヌホオズキ類、ヒユ類）が増えています。
早期発見に努め、見つけ次第速やかに防除（手取り除去，除草剤散布）してください。

帰化アサガオと大型雑草
に覆われた大豆ほ場

表1 大豆の生育期処理除草剤

対象雑草名	薬 剤 名	使 用 時 期	使用方法	10a当たり散布量	本剤使用回数
1年生雑草	バスタ液剤 (非選択性除草剤)	本葉5葉期以降、雑草生育期 但し、収穫28日前まで	畦間・株間 処理	薬量 300～500ml (水 100ℓで希釈)	3回以内
	ロロックス (非選択性除草剤)	本葉3葉期以降、雑草生育期 (雑草の草丈15cm以下)		薬量 100～200g (水 70～150ℓで希釈)	1回

※バスタ液剤、ロロックスの散布は吊り下げノズルを用い、大豆に薬剤がかからないよう注意して散布してください。

3. 病害虫防除

～適期の病害虫防除により、高品質な大豆に仕上げましょう！～

表2 薬剤と散布時期の目安

防除体系	防除時期の目安		対象病害虫	剤型	薬 剤 名	使用時期	10a当たり散布量
随時	7月下旬～8月上旬 (葉が巻き始めたら)		ウコンノ メイガ	粉剤	ダントツH粉剤DL	収穫7日前まで	4kg
				液剤	プレバソン フロアブル5	収穫7日前まで	4,000倍 150ℓ
基本 (1回目)	英が伸び きった頃	8月10 日頃	紫斑病	粉剤	Zボルドー粉剤DL	－	3kg
				液剤	プランダム乳剤25	収穫7日前まで	4,000倍 150ℓ
			カメムシが 多い場合 紫斑病 カメムシ類	粉剤	Zボルドー粉剤DL スタークル粉剤DL	－	3kg 3kg
				液剤	プランダム乳剤25 スミチオン乳剤	収穫7日前まで 収穫21日前まで	4,000倍 150ℓ 1,000倍 150ℓ
基本 (2回目)	1回目の 10日後	8月20 日頃	紫斑病 カメムシ類 マメシキイガ	粉剤	トライトレボン粉剤DL	収穫14日前まで	3kg
				液剤	アミスタートレボンSE	収穫14日前まで	1,000倍 150ℓ

※防除の際は、農薬使用基準を必ず守り、風向き等に注意し、周辺への飛散防止に努めましょ

○カメムシの加害が著しい
と、大豆が青立ちする場
合があります。

○8月下旬～9月上旬に、
カメムシ類が多い場合は、
ダントツ剤等で追加防除
を行いましょう。



イチモンジカメムシ(約1cm)



ホソヘリカメムシ(約1cm)

大豆を加害するカメムシ類※()は体長



ウコンノメイガによる葉巻き
(1株に6個以上の葉巻きがあれば要防除)