

「富富富」情報(第2号)



令和8年4月

JAなのはな『富富富』ブランド化推進協議会

1. 基肥の適正な施用

- 基肥はコシヒカリの2割減を基本とし、**低収ほ場(単収540kg以下)では1割減～コシヒカリ並とする。**
- 転作あと田で作付する場合は分施肥栽培とし、基肥量は(表1)と同量～3割減肥とする。

表1 基肥施肥の目安

土質	肥効調節型基肥		分 施(側条施肥)			
	肥料名	施肥量 (10a当たり)	設計 I		設計 II	
			肥料名	施肥量 (10a当たり)	肥料名	施肥量 (10a当たり)
砂質	富富富専用	32kg	なのはな 有機基肥	28kg	基肥555	24kg
壤質		28kg		24kg		20kg
粘質		24kg		20kg		16kg

2. 適切な田植作業の実施

- 安定した食味を確保するため、**田植えは5/15を中心(5月2半旬～4半旬)に実施**しましょう。
- 栽植密度70株/坪、植付本数3～4本/株、植付深さ3cm**となるよう田植機を調整しましょう。
- 苗箱施薬剤の使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう。

3. 初期の水管理と雑草防除の徹底

- 田植後3日間程度はやや深水**にして活着を促進し、**活着後は浅水管理**により水温の上昇に努め、**分けつの発生を促進**しましょう。
- 除草剤の散布後5日間は湛水状態、散布後7日間は止水管理**としましょう。
- 除草剤使用にあたっては、登録内容を遵守するとともに、**必ず成分数を確認**しましょう(表2)。

表2 雑草防除体系の例

ほ場条件	薬剤名	使用時期	使用量 (10a当たり)	対象雑草	成分数	
・雑草が多い場合 ・前作が富富富以外	初期剤 ↓ 一発剤	マーシエット 1キロ粒剤 (※漏生対策)	移植後3～5日頃まで (ノビエ1.0葉期まで)	1kg	水田一年生雑草・マツバイ・ホタルイ・ミズガヤツリ、ヘラオモダカ	1
	一発剤	ゼータプラス 1キロ粒剤	初期剤散布後 7～12日頃 (ノビエ3.5葉期まで)	1kg	水田一年生雑草・多年生雑草・エゾノサヤヌカグサ	2
・雑草が少ない ・前作も富富富	一発剤	ベッカク 1キロ粒剤	(移植時)～ 移植後13日頃まで (ノビエ2.5葉期まで)	1kg	水田一年生雑草及び多年生雑草、アオミドロ・表層剥離	3

「農作業事故ゼロを目指して事故防止対策を徹底しましょう」
春の農作業安全運動実施中!(3/1～5/31)