

# 防除日の変更について（号外1号）（追分・吉作・住吉・花ノ木・東老田 版）

令和8年4月3日  
呉羽地区果樹組合連合会

## 1 防除日の変更について

当初の予測よりも梨の開花が早まっているため、今後の防除日を下表のとおり変更します。

### 【防除スケジュール（吉作：「幸水」基準）】

散布月日		薬剤名と濃度		散布量	主な対象病害虫	防除実施日 (自己記入)	
4	変更	4月10~12日 (開花直前) 1分咲き	ネクスターフロアブル オーソサイド水和剤 80	1,500倍 1,000倍	300 リットル	黒星病、赤星病 輪紋病、黒斑病、 うどんこ病	
5	変更	4月19~21日 (落花直後)	デランフロアブル	1,000倍	300 リットル	黒星病、赤星病、 心腐れ症(胴枯病 菌)	
特	4月24日 ~5月5日 頃	コンフューザーN	150本/10a	リンゴコクモンハ マキ、モモンクイ ガ、ナシヒメシク イ			
6	変更	4月27日~29日 (落花10日後)	ベランティーフロアブル トレノックスフロアブル モベントフロアブル	8,000倍 500倍 2,000倍	300 リットル	黒星病、赤星病、 心腐れ症(胴枯病 菌) ニセナシビダニ、アブラ ムシ類、カイガラムシ類	

「ハチハチフロアブル」の在庫がある場合は、「モベントフロアブル」を「ハチハチフロアブル」（2,000倍）に代えることができます。  
なお、「オーシャイン水和剤」の在庫がある場合は、来年使用する予定なのでそのまま保管してください（ただし、使用期限に注意！）。

※上記防除スケジュールは、吉作・幸水を基準としています。自園地の生育状況を十分確認して、防除を実施してください。

※開花期頃にハマキムシ類の発生が多かった園では5回目のデランフロアブルにサムコルフロアブル10（5,000倍）を混用してください。

※6回目防除時期にアブラムシ類の発生が見られた場合、早めにアドマイヤー水和剤（2,000倍、収穫3日前まで、年2回以内）を単剤散布してください（6回目には混用しない）。

※散布に当たっては、希釈倍数や対象病害虫など、農薬容器のラベルを必ず確認してください。

※周囲の他作物や住宅等への飛散防止に努めてください。特に通学路に面した園地では登下校時の時間帯を考慮して散布してください。

※黒星病の芽基部病斑は見つけ次第、切除して園外に持ち出し、適正に処分してください。

※今後の霜の被害に注意してください（対策は栽培情報2号参照）。

周囲の農作物や住宅等への農薬の飛散に十分注意して散布してください